

# SEMANARIO

## DE AGRICULTURA Y ARTES

Del Jueves 25 de Junio de 1807.

Concluye el Ensayo sobre las variedades de la vid  
común.

98. - ALMUÑECAR. *LONGA*.

*Æ* stampa XXVII.

ALMUÑECAR en Sanlúcar, Xerez, Trebugena, Moguer, Algeciras, Arcos, Espera, Paxarete y Málaga.

PASA LARGA en Almuñecar.

LARGO en Málaga.

UVA DE PASA en Motril, Albuñol, Adra, taha de Pitres y Ohanez.

RACIMOS delgados muy ralos: UVAS oblongas muy delgadas blancas.

RACEMIS *gracilibus*: ACINIS *rarissimis oblongis gracillimis albis*.

LAYREN ó DATILERA. Herrera, *loc. cit. lib. 2, cap. 2, §. II?*

UVA DE PASA. Valcarc. *loc. cit. pag. 22.*

ALMUÑECAR ó LARGO. La Leña, *loc. cit. pag. 22.*

CEPA delgada, brota en el tiempo ordinario.

SARMIENTOS muchos, muy largos, rollizos, enteramente lampiños, de color pardo-rojizo algo claro, muy blandos: cañutos medianos: rebuscos muy pocos. ZARCI-

LOS opuestos todos á las hojas, ramosos.

HOJAS mas amarillas que las del Ximenez, con las quales convienen en todo lo demas.

*Estambres* cinco, persisten muchos estirados pintada ya la uva.

RACIMOS bastantes, á veces muchos, largos (de unas diez pulgadas contando el pezon, con poco mas de quatro en su mayor grueso), recompuestos en su parte superior y compuestos en la inferior: *gajos* muy largos: *agracejo* poco: *uva menuda* poca ó bastante. PEZON mediano ó algo largo, algo grueso, muy tierno, muy blanquizco, con *tamborilete* por lo comun. PEZONCITOS con muy pocas *verrugas* ó ninguna, con el *rodetete* poco abultado.

UVAS de diez líneas de largo con seis y media por lo mas grueso, algo adelgazadas hácia la punta, muy frecuentemente algo cóncavas por el lado que mira al escobajo y convexas por el opuesto, muy obtusas, algo y á veces bastante doradas, muy traslucientes, muy carnosas, tempranas: *hollejo* algo grueso. ANILLO bastante marcado, de cinco lados, de color pardo-rojizo claro. SEMILLAS dos por lo comun, algo cortas, de color pardo-rojizo claro.

*Observacion 1ª.* Las qualidades de muy húmedas y de pudrir luego, que da Herrera á sus Datileras, convienen mejor que á esta á la variedad anterior.

*Observacion 2ª.* Se parece muchísimo á ella la que llaman PALOT en Titaguas y otros pueblos del Reyno de Valencia.

Su mosto hace buena liga con el de la Ximenecia, segun La Leña.

Su pasa vale siempre en el comercio doble que qualquiera otra, y es la famosa de Málaga que se hace al sol.

Á ella debe Almuñecar gran parte de su riqueza.

Tambien la cultivan para hacerla pasa en muchas viñas de Sanlucar, Xerez, Paxarete y Adra; y en casi todas las de Trebugena, Arcos, Espera y Albuñol.

99. - BOTON DE GALLO. *ORCHIDEA*.

BOTON DE GALLO en Sanlucar , Xerez , Trebugena,  
Arcos , Espera y Paxarete.

VERDEJO en Trebugena.

SARMIENTOS largos : RACIMOS pequeños : UVAS apiñadas do-  
radas muy dulces.

*RAMIS longis : RACEMIS parvis : ACINIS confertis aureis dulcis-  
simis.*

Difiere ademas de la anterior por sus SARMIENTOS  
mas duros : HOJAS con los *senos* algo mas profundos y  
mas pelosas : PEZON leñoso : UVAS mas chicas , jugo-  
sas , mucho mas dulces , algo menos tempranas ; con el  
ANILLO mas señalado y mas rojizo.

Se encuentra en muchas viñas de Sanlucar , Xerez,  
Arcos , Espera y Paxarete , y en casi todas las de Tre-  
bugena.

100. - BOTON DE GALLO NEGRO. *FUCUNDA*.

BOTON DE GALLO NEGRO en Xerez.

HOJAS amarillo-verdosas : UVAS negras muy dulces.

*FOLIIS luteo-viridibus : ACINIS nigris dulcissimis.*

En todo lo demas conviene exâctamente con la anterior.  
Se cultiva en San Julian , pago de Xerez , y en el  
Puerto de Santa María , pago de Balbaína.

---

*TRIBU XV.*
*MOSCATILES. APIANÆ.*

UVAS almizcladas (con olor y sabor parecidos al del  
almizcle).

*Acinis moschatis.*

Llamaban *Apianæ* los latinos á dos castas de uvas , diversas en mi opinion de todos nuestros moscateles , aunque han dado en confundirlos con ellas los escritores modernos. Adopto dicha denominacion para los que yo describo por convenirles tambien como á las Apianas de Columela y Plinio el ser muy apetecidos de las abejas (*apes*).

101. - MOSCATEL MENUDO BLANCO. *GENEROSA*.

MOSCATEL MENUDO BLANCO en Sanlucar , Xerez, Trebugena , Arcos , Espera , Paxarete , Conil , Tarifa , Motril , Sorbas , &c.

MOSCATEL MORISCO ó FINO en Málaga.

MOSCATEL COMUN en Ocaña.

UVAS redondas doradas.

ACINIS *rotundis aureis*.

MOSCATEL. Herrera , *loc. cit. Lib. 2 , cap. 2 , §. 3.*

*Vitis vinifera , omnium praecursor , acinis è viridi flavis , nitidis , mediis , succosis , rotundis , praessulis , nunc raris , nunc densatis , praesuavi moschoto sapore. Vitis APIANA Plinio C. B. P. Var. 298. VITIS MUSCHATILLA Petri Castell. Hort. Mess. vulgo MUSCATEDDU URANCU. Cupani , loc. cit. pag. 231 ?*

MOSCATEL CASTELLANO. *Fuente dueña , loc. cit. pag. 290.*

MOSCATEL COMUN. *Valcarc. loc. cit. pag. 16 , y Boutelou , loc. cit. pag. 328.*

MOSCATEL MORISCO ó FINO. *La Leña , loc. cit. pag. 24.*

CEPA delgada , brota temprano.

SARMIENTOS muchos , tendidos , muy desiguales en longitud , delgados , rollizos , enteramente lampiños , de color pardo-rojizo muy subido , muy blandos : cañutos algo largos : *rebuscos* pocos. ZARCILLOS opuestos á las hojas , ramosos.

HOJAS algo pequeñas , algo irregulares , enteras ó casi enteras , con el *seno de la base* agudo , lustrosas y de color verde algo amarillento bastante subido en su parte superior , muy poco pelosas en la inferior : *dien-*

tes algo cortos. CABILLO liso, de color rojo subido, en ángulo agudo con la hoja ordinariamente.

RACIMOS pocos, pequeños, aovado-cilíndricos, muy apretados, sin *agracejo*. PEZON algo leñoso y rara vez acompañado de *tamborilete*.

UVAS pequeñas, casi iguales, muy obtusas, con la superficie igual, bastante duras, bastante carnosas, de sabor muy dulce empalagoso, muy tempranas, se pudren pronto: *hollejo* algo grueso. ANILLO ninguno.

*Observacion.* Nadie ha notado en los Moscateles de Andalucía la qualidad que atribuye á este Valcárcel y que Fuentedueña extiende al gordo blanco y gordo morado, y Herrera supone en otras castas, de causar su uva comida con exceso dolores de cabeza y aun calentura. Lo mismo asegura Plinio de una variedad española y Columela de las Apianas. Recelo que los autores castellanos copiaron esta especie de los latinos y estos de los griegos. Puede que la uva moscatel por ser tan azucarada fermente alguna vez mas bien que otras en estómagos muy débiles, y produzca en este caso alguna de las incomodidades que se le han atribuido. El hombre sano que digiera regularmente puede comerla sin recelo.

Esta variedad es la que da el mejor vino moscatel. El de Málaga se hace con una sexta parte de su uva y cinco de la del Ximenez.

Se cultiva en manchas en los pueblos arriba citados. Es comun en Castilla la nueva.

102. - MOSCATEL MENUDO MORADO. *MOSCHATA*.

MOSCATEL MENUDO MORADO en Sanlucar, Trebujena, Arcos, Espera, Paxarete, Conil, Tarifa, Motril y Puebla de D. Fadrique.

UVAS redondas rojas.  
*ACINIS rotundis rubris.*

Solo difiere de la anterior por el color de la uva.

Se cultivan algunas manchas de ella en Sanlucar, y algunas cepas en los demas pueblos citados.

103. - MOSCATEL GORDO MORADO. *OBOVATA*.

*Estampa de los caractéres de la vid comun , fig. 1.*

MOSCATEL GORDO MORADO en Sanlucar, Xerez, Trebugena, Conil, Motril y Poqueira.

UVAS trasovadas moradas.

ACINIS obovatis violaceis.

*Vitis vinifera praefatae penè aequali ac concolori fructu, non tamen ita saturatè , duriolo , delicati saporis , tenero racemo , vulgo NIURIDDUNI. Cupani , loc. cit. pag. 231?*

*MUSCAT LONG VIOLET. Liger , La nouvelle Maison rustique , pag. 456?*

*MOSCATEL ROMANO MORADO. Fuentedueña , loc. cit. pag. 290?*

*Vitis apiana , acino magno , oblongo , violaceo. moschato. MUSCAT VIOLET. Du Hamel , loc. cit. pag. 209.*

*VIOLET MUSCAT. Weston , loc. cit. pag. 153.*

*MOSCATELON ENCARNADO. UVA DE CONSTANZA. Traduc. del Rozier , loc. cit. pag. 172.*

Difiere ademas del moscatel menudo blanco por su CEPA muy gruesa : SARMIENTOS algo mas gruesos, de color ménos subido, con bastantes *rebuscos* : RACIMOS grandes, muy ralos, con bastante *agracejo* y el PEZON tierno : UVAS grandes, mas duras, de mas grueso *hollejo*, ménos dulces, ménos tempranas y de mas aguante ( se conservan muy bien colgadas ).

*Observacion.* Fuentedueña asegura que esta variedad y la siguiente son de mas noble sabor por no tener tanto resquemo y aspereza el moscatel menudo blanco, observacion que vale tambien en Andalucía.

Se cultiva en Sanlucar, Xerez, Trebugena, Castilla la nueva, Francia, &c.

## 104. - MOSCATEL GORDO BLANCO. ISIDORI (1).

MOSCATEL GORDO BLANCO en Sanlucar, Xerez, Trebugena, Arcos, Espera, Paxarete, Chipiona, Cadiz, Conil, Tarifa, Algeciras, Almuñecar, Motril, Poqueira, Cuebas, Baza y Somontin.

MOSCATEL ROMANO en Manises á dos leguas de Valencia.

MOSCATEL REAL en Motril.

MOSCATELON ó MOSCATEL FLAMENCO en Málaga.

MOSCATEL en varios pueblos de los citados, y en muchos de Valencia.

UVAS trasovadas algo doradas.

ACINIS obovatis subaureis.

MOSCATEL ROMANO BLANCO. *Fuente dueña*, loc. cit. pag. 290?

THE RAISIN MUSCAT. Miller, *The Gardeners Dict.*?

MUSCAT BLANC. *Traité des Jardins. Premier partie*, pag. 336.

MOSCATEL ROMANO. *Valcarc.* loc. cit. pag. 17, y *Del Vao*, *ibid.* pag. 249.

MOSCATELON ó MOSCATEL FLAMENCO. *La Leña*, loc. cit. pag. 23.

Solo difiere de la anterior por el color del SARMIENTO que es amarillo de caña y por el de la UVA.

Pesó su mosto de uvas de Chipiona con tres dias de asoleo en 15 de Septiembre 12, y el de la Palmosa en 26 del mismo 13 grados.

*Observacion.* En el Hornillo, pago de Sanlucar, he

(1) Doy á esta variedad el nombre de San Isidoro de Sevilla, no por algun motivo supersticioso ó relacion sobrenatural é imaginaria que tenga la planta con tan ilustre varon, quales supone de muchas que denomina con nombres de santos el vulgo español, y en especial el de Andalucía; sino por lo que trabajó aquel gran Prelado en ilustrar las etimologías ampelográficas. Véase la pag. 116.

visto una cepa con quatro SARMIENTOS de esta variedad, y dos inxertos, de la anterior.

De sus uvas se hace la pasa de sol mas apreciada, que llaman en Málaga Moscatel gorrón, y se extrae en gran cantidad de Almuñecar y otras partes de la costa.

Se cultiva en manchas en los lugares arriba citados.

Hay algunas parras de ella en Cádiz.

Se conoce tambien en Castilla la nueva.

En Conil la cultivan para vender en los mercados de Cádiz y la Isla.

---

## VARIETADES AISLADAS.

105. - DE BOUTELOU. *BOUTELOU* (1).

*Estampa XXVIII.*

UVAS grandes casi trasovadas algo doradas duras algo dulces.

*ACINIS magnis subobovatis subaureis duris subdulcibus.*

Es preciso quedar sorprendido quando al gustar el fruto de esta variedad se la encuentra sin aquel sabor peculiar característico de los Moscateles: tanta es la semejanza que tiene con el del anterior. Sin embargo pasando al cotejo analítico de los caracteres he reconocido que sus HOJAS son todavía menos pelosas: sus RACIMOS mas apretados y sus UVAS mas redondas.

El Capataz que la cultiva añadió que es mas esquilmeña que el Moscatel gordo blanco.

Se cultiva en Sanlúcar, pago de Maina, hacienda del Castillo.

(1) Variedad dedicada al célebre D. Esteban BOUTELOU, restaurador de la Ampelografía en España, y uno de los que mas han adelantado con sus descubrimientos la teoría de la ciencia.

106.- VIGIRIEGA DE MOTRIL. *SACHSI* (1).

## VIGIRIEGA en Motril.

SARMIENTOS postrados broncos: HOJAS verde-amarillentas: UVAS medianas casi redondas blanco-verdosas dulces.

RAMIS prostratis fragilibus: FOLIIS viridi-luteis: ACINIS mediocribus subrotundis albo-viridibus dulcibus.

Apenas difiere de la Vigiriega comun sino por sus SARMIENTOS algo gruesos: UVAS de siete líneas de largo con seis y media de grueso, algo duras, algo tardías, y por los demas caractéres que constan en la definicion.

*Observacion.* A esta variedad creo que deba referirse el Vigiriego que he visto en varios pueblos de la Alpujarra, y acaso tambien el que cultivan con el mismo nombre en Torviscon y otros pueblos de la Contraviesa.

Se cultivan algunas cepas de ella en muchas viñas de Motril.

107. - JAMÍ. *VIVAX*.*Estampa XXIX.*

JAMÍ en Granada, Motril, barranco de Poqueira, Huescar y Orce.

AMÍ en la puebla de D. Fadrique.

ROCHAL en Valencia.

ROJAL en Madrid, Ohanez, Guadix, Baza, rio Almanzora, Sierra de Filabres y algunos pueblos de Valencia y Murcia.

ROYAL en Titaguas y otros pueblos de Valencia.

SARMIENTOS algo erguidos: HOJAS verde-amarillentas: UVAS medianas muy redondas de color violado-negrusco sabrosas.

RAMIS erectis: FOLIIS viridi-luteis: ACINIS mediocribus rotundissimis violaceo-nigris sapidis.

*Vitis acino rubro, duriori, sapore dulci* GREC. Garidel, *Histoire des plantes*, pag. 495?

CEPA algo gruesa, con la corteza bastante gruesa y bastante adherente, brota en el tiempo ordinario ó algo tarde, muy vivaz.

SARMIENTOS medianos, muy gruesos, muy blanquicos, duros: cañutos cortos: rebuscos bastantes. NIETOS muchos.

HOJAS algo grandes, casi orbiculares, casi enteras, lisas en su haz, casi lampiñas en el envés, caen tarde: dientes algo cortos. CABILLO verde-blanquico, á veces rojizo y tambien rojo.

FLORES con algunas corolas persistentes: estambres cinco ó seis que suelen persistir pintada ya la uva mas ó ménos ensortijados.

RACIMOS muchos, grandes, casi cilíndricos, muy apretados ordinariamente: agracejo muy poco ó ninguno. PEZON cortísimo, duro. PEZONCITOS poco verrugosos, con el rodete bastante abultado.

UVAS de seis líneas de diámetro, casi iguales, muy obtusas, con la superficie igual, se desprenden del pezoncito con dificultad, bastante duras, bastante carnosas, de sabor dulce muy agradable y nada empalagoso, muy tardías, pincel ninguno: estigma muy persistente: hollejo algo grueso. ANILLO bastante marcado, compuesto de cinco ó seis glándulas muy chicas reunidas por su parte inferior, casi orbiculares, amarillo parduzcas.

*Observacion 1ª.* En el Reyno de Valencia, en las parras del de Granada y en Madrid se pone ménos negruzca la uva de este vidueño.

*Observacion 2ª.* Colgada su uva se arruga mas que la de otras castas y está bastante expuesta á pudrirse por lo apretado del racimo.

*Observacion 3ª.* En el barranco de Poqueira cultivan en parras una variedad que llaman JAMÍ NEGRO, la qual,

(1) Variedad dedicada á F. J. SACHS, autor de la Ampelografía que cité en la pag, 135.

segun dicen, sólo difiere de la que acabo de describir por el color de la uva, y en nada del Amí de los Ve-  
lez, ni del ROYAL NEGRO del Reyno de Valencia.

Cultivan bastante este vidueño en las viñas y no tanto en las parras de Granada para vender su uva en el mercado.

Tambien lo cultivan algo en los demas pueblos arriba citados para comer y colgar su fruto.

En la Real casa de aves que tiene S. M. en el Buen-Retiro se ha propagado mucho esta hermosa casta por el cuidado de su Director Don Eusebio Arias, que la hizo traer de Murcia con algunas otras.

108. - TERANA. *TERANA.*

*Estampa XXX.*

SARMIENTOS algo duros: HOJAS pequeñas de color verde algo amarillento: UVAS muy apiñadas medianas muy redondas doradas duras.

*RAMIS subduris: FOLIIS parvis viridi-subluteis: ACINIS confertissimis mediocribus rotundissimis aureis duris.*

Este vidueño es un precioso testimonio <sup>r</sup> de la variedad infinita con que ha combinado Naturaleza las propiedades de sus producciones y de la vanidad de los que presumen reducirlas á sistema. Al contemplar una diversidad de formas tan prodigiosa no puede ménos de reconocerse que el monstruo de Horacio nada presenta de contradictorio, y que si la Historia natural llega á tener un falsificador tan diestro como algunos de los que han procurado embrollar la civil y la eclesiástica, nadie podrá rastrear la impostura por el simple examen de las descripciones. Yo estudié la Terana cargada de fruto comparándola con muchos individuos del Moscatel menudo morado que la rodeaban, y quando volví á verla despues de la vendimia, ya no me fué posible distinguirla de ellos. Presenté sus racimos á los mejores conocedores y

<sup>r</sup> Otro casi igual tenemos en el Ximenez loco.

todos decidían que era Listan común, aun después de gustar la uva. He aquí las únicas diferencias que pudimos notar entre ella y los dos vidueños dichos después de un escrupuloso cotejo.

SARMIENTOS mas gruesos, algo duros: *estambres* que persisten muchos madura ya la uva: RACIMOS mas constantemente grandes (pesó uno hasta siete libras), mas apretados por lo común, con los *gajos* cortos, sin *uva menuda* ó con muy poca; PEZON mas corto, mas grueso, algo leñoso, pardo; *rodete* bastante abultado. UVAS linea y media mas gruesas, con el ANILLO compuesto ordinariamente de seis *glándulas* amarillo-parduzcas; SEMILLAS de dos á quatro, amarillentas.

El Señor D. Francisco Teran, á quien la dedico, dice que pudo últimamente distinguirla por el sabor, y persuadido de que sea una de las mas apreciables para vinos piensa darla á conocer y hacer los primeros ensayos en su cultivo y mosto.

Se cultivan unas doce cepas de este vidueño en el pago de Munibe, plantadas de sarmientos traídos de Moguer.

109. - ALBAN REAL. *SPHÆROCARPA.*

ALBAN REAL en Granada <sup>1</sup>.

SARMIENTOS algo duros: HOJAS verdes muy poco pelosas: UVAS grandes muy redondas blancas sabrosas.

RAMIS *subduris*: FOLII *viridibus vix pilosis*: ACINIS *magnis rotundissimis albis sapidis*.

CEPA gruesa, brota muy temprano.

SARMIENTOS postrados, pardo-blanquizcos: *cañutos* algo cortos: *rebuscos* muchos. NIETOS bastantes.

HOJAS medianas, casi lobadas, con los *senos* agudos: *dientes* medianos. CABILLO verde-amarillento, teñido muy ligeramente de rojo.

\* Le llaman así en contraposición del Alban común. (1. Uberrima).

RACIMOS pocos, grandes, flojos, con bastante *agrajejo*. PEZON largo, tierno, verdoso.

UVAS de nueve líneas y media de diámetro, casi iguales, muy obtusas, con la superficie igual, traslucientes, con las *venas* muy manifiestas, algo duras, poco carnosas, de sabor dulce poco intenso y algo adstringente pero muy agradable, muy tempranas: *pincel* pequeño ó ninguno: *hollejo* delgado. ANILLO poco marcado.

*Observacion.* Este vidueño suele echar algun rebusco en el pezon ó pie de los zarcillos.

Se cultiva en algunas viñas y emparrados de Granada.

110. - MOSCATEL DE FLANDES. *PSEUDOAPIANA.*

MOSCATELON ó MOSCATEL DE FLANDES en Granada.

HOJAS verde-amarillentas muy poco pelosas: UVAS grandes muy redondas verdes.

*FOLIIS viridi-luteis vix pilosis: ACINIS magnis rotundissimis viridibus.*

Difiere además de la variedad anterior por sus SARMIENTOS con ménos *rebuscos*: RACIMOS en mayor número: UVAS de ocho líneas y media de largo con nueve de grueso, algo mas duras, menos jugosas.

*Observacion.* Llaman Moscatelon á esta variedad porque; dicen, suele tener un sabor de moscatel poco perceptible y muy agradable. Si así fuese podría colocarse en la tribu de los Moscateles, á los cuales se aproxima en efecto bastante por sus demas caractéres, y reunirse á la casta que llaman MOSCATEL ROMANO BLANCO en el Real Jardin Botánico de Madrid, pues no se diferenciaría de ella sino por tener el hollejo mas delgado. Este Moscatel de Madrid es muy probablemente el que cita Fuentedueña con el mismo nombre.

Se cultiva en los emparrados del Carmen de Don Simon de Argote junto al Darro, y en otros de Granada.

## SANTA ISABEL en Granada.

SARMIENTOS duros: HOJAS poco pelosas: UVAS muy grandes redondas blancas blandas insipidas.

*RAMIS duris: FOLIIS subpilosus: ACINIS maximis rotundis albis mollibus insipidis.*

Difiere ademas del Alban real por su CEPA que brota tarde: RACIMOS en mucho mayor número: UVAS del largo de diez líneas y media y casi igual grueso, un poquito mas blandas y jugosas, mas tardías.

*Observacion.* La variedad que llaman MARQUESA en el Real Jardin botánico de Madrid debe colocarse entre esta y el Alban real. Los senos de sus hojas suelen profundizar bastante y ensancharse un poco. Sus uvas son tan grandes como en la Sta. Isabel y algo mas gruesas que largas, desiguales, nada adstringentes y menos dulces que las del Alban real, con el qual conviene en todo lo demas.

Se cultiva en las parras de Granada.

112. - VAOA. *VAOA* (1).

RACIMOS muy ralos: UVAS menudas oblongo-aovadas negruzcas algo duras agrias.

*ACINIS rarissimis minutis oblongo-ovatis nigrescentibus duriusculis acidis.*

SARMIENTOS mas gruesos que en ningun otro de los vidueños bravíos que he visto, broncos, pardo-amari-llentos.

HOJAS y CABILLO como en el Almuñecar.

RACIMOS grandes, muy ralos, con mucho *agracejo*.

UVAS muy traslucientes, jugosas, de *hollejo* grueso, muy tardías (maduran hácia fines de Septiembre).

Crece silvestre en la Algaida, en el sitio llamado Rincon del Lentiscar.

(1) Variedad dedicada á Don Juan del VAO, cuyo artículo puede verse en la pag. 130.

113. - RUIZIA. *RUIZIA* (1).

HOJAS palmeadas: RACIMOS ralos: UVAS medianas casi redondas negras carnosas.

FOLIIS palmatis: ACINIS raris mediocribus subrotundis nigris carnosis.

CEPA brota en el tiempo ordinario.

SARMIENTOS muchos, algo erguidos, cortos, delgados, rojo-parduzcos, blandos: cañutos cortos: rebuscos muy pocos. NIETOS muy pocos.

HOJAS medianas, algo lustrosas y de color verde algo amarillento en su parte superior, muy poco pelosas en la inferior: gajos muy puntiagudos: dientes largos. CABILLO liso, de color rojo claro.

RACIMOS bastantes, medianos, ralos, sin agracejo. PEZON correoso.

UVAS de hollejo algo grueso, poco dulces, tardías.

Se cultivan algunas cepas de ella en Paxarete.

114. - MOLLAR DE GRANADA. *Z E Æ* (2).

Estampa XXXI.

MOLLAR en Granada y Motril.

MOLLAR ZUCARÍ en Granada.

SARMIENTOS broncos: HOJAS verde-amarillentas: UVAS medianas ó muy grandes de varios colores blandas sabrosas.

RAMIS fragilibus: FOLIIS viridi-luteis: ACINIS mediocribus maximisque versicoloribus mollibus sapidis.

(1) La dedico á Don J. M. Ruiz de Granada, uno de los que me han comunicado mas datos para esta obra; y á Antonio Ruiz de Paxarete, viñador muy instruido de los PP. Gerónimos.

(2) Dedico esta variedad al Señor D. F. A. ZEA, Gefe y primer Profesor del Real Jardín botánico; porque ademas de suministrarme algunos datos importantísimos sobre la tribu de los Mollares y vidueños afines, se ha tomado un interes singularísimo en la perfeccion de todo el Tratado, dirigiéndome especialmente en quanto pertenece al Arte de escribir que tan eminentemente posee, y en que lo reconozco por mi principal Maestro.

MOLLAR. *Valcarc. loc. cit. pag. 23?*

CEPA mediana, con la corteza bastante adherente.

SARMIENTOS casi horizontales, algo gruesos, rollizos, enteramente lampiños, de color pardo-rojizo poco subido: *rebuscos* bastantes. NIETOS bastantes.

HOJAS medianas, bastante irregulares, casi enteras ó lobadas, con los *senos* ordinariamente agudos, lisas en su haz, casi enteramente lampiñas en el envés: *gajos* cinco por lo comun, á veces cortados, nada puntiagudos: *dientes* medianos. CABILLO lustroso, de color rojo algo claro.

RACIMOS y UVAS como en el Mollar cano.

*Observacion.* No sé que se haya observado en vidueño ningún respecto del tamaño de las uvas tan notable diferencia como la que presenta este, si es cierto, como parece y me han asegurado, que son de él aquellas uvas de pulgada de diámetro que se venden en las plazas de Granada cogidas en los parrales.

Se cultiva en algunas viñas y emparrados de Granada, Motril y otros pueblos de la misma Provincia.

115. - CAÑOCAZO. *HIRSUTA.*

*Estampa XXXII.*

CAÑOCAZO en Xerez y Trebugena.

MOLLAR BLANCO en Sanlucar y Trebugena.

SARMIENTOS algo erguidos broncos: HOJAS muy peludas amarillentas: UVAS muy redondas doradas blandas.

*RAMIS suberectis fragilibus: FOLIIS hirsutissimis lutescentibus: ACINIS rotundissimis aureis mollibus.*

*WHITE SWEET WATER* Langley, *loc. cit. p. 113. Lam. 50?*

CEPA gruesa, brota temprano.

SARMIENTOS muchos, erguidos unos y otros algo inclinados al horizonte, medianos, gruesos, de color ro-

jo-parduzco claro con mezcla de amarillo: *cañutos* largos: *rebuscos* pocos. YEMAS gruesas, poco agudas.

HOJAS las inferiores grandes, enteras ó casi enteras, muy peludas; las demas medianas, casi enteras ó lobadas, á veces palmeadas y con senos acorazonados, poco peludas; de figura irregular, verde-amarillentas: *dientes* medianos. CABILLO de color rojo claro, en ángulo casi recto con la hoja.

RACIMOS grandes, algo ralos. PEZON tierno, de color verde muy blanquizco.

UVAS grandes, rara vez medianas, muy obtusas, con la superficie igual, de sabor dulce algo empalagoso, tempranas: *hollejo* delgado. ANILLO bastante marcado, de color pardo-rojizo claro.

Pesó su mosto en Sanlucar en 19 de Septiembre 11  $\frac{1}{2}$  grados.

*Observacion.* Segun opinan algunos los individuos del Cañocazo que producen uvas medianas, pertenecen á otra variedad: yo los reduzco á esta porque no presentan diferencia alguna que los separe de ella fuera de la dicha.

Se cultiva en manchas en Trebugena, y salteado en Xerez y Sanlucar.

#### 116. - UVA DE REY. *REGALIS.*

*Estampa XXXIII.*

UVA DE REY en Xerez, Trebugena, Arcos, Espera, Paxarete y Moguer.

TAMORLANA en Sanlucar.

HOJAS de color verde-amarillento: RACIMOS ralos: UVAS muy grandes entre cilíndricas y algo trasovadas blancas algo duras.

FOLII *viridi-luteis*: ACINIS *raris maximis cilindrico-subobovatis albis duriusculis.*

CEPA gruesa, brota en el tiempo ordinario.

SARMIENTOS pocos, horizontales, medianos, algo delgados, rollizos, enteramente lampiños de color pardo-rojizo algo claro, *rebuscos* muy pocos. NIETOS pocos.

HOJAS algo pequeñas , algo irregulares , enteras por lo comun , á veces algo lobadas , algo lustrosas en su haz , casi enteramente lampiñas en el envés : *dientes* algo cortos . CABILLO lampiño , de color rojo algo claro , en ángulo casi recto con la hoja .

RACIMOS grandes , irregulares , algo recompuestos en su parte superior , compuestos en la inferior , muy ralos : *gajos* muy largos : *agracejo* ninguno : *uva menuda* poca . PEZON largo , medianamente grueso , tierno , verdoso . PEZONCITOS con algunas *verrugas* medianas blanquizas y el *rodete* bastante abultado .

UVAS de doce líneas de largo y diez de grueso , muy desiguales , muy obtusas , con la superficie igual , muy traslucientes , poco carnosas , de sabor dulce algo áspero que disgusta y se hace sensible despues de mascada la uva , tempranas : *hoyuelo* muy grande : *estigma* muy persistente , constantemente central : *hollejo* muy delgado . ANILLO muy marcado , de cinco lados poco señalados ; de color pardo-rojizo subido . SEMILLAS una , á veces dos , algo cortas , de color pardo claro .

*Observacion.* En la viña de García , pago del Magalete , he visto un vidueño sin nombre que echa muy pocos racimos , muy desmedrados y llenos de uva menuda , tan parecido en lo demas á la Tamorlana de Sanlucar que apenas dudo sea la misma variedad , degenerada en Motril por el descuido con que se la ha tratado .

Se cultivan muchas cepas de ella , con el objeto de colgar su uva , en Arcos , y algunas en los demas pueblos arriba citados .

117. - CIUTÍ. *PALLADII* (1).

*Estampa XXXIV.*

CIUTÍ en Granada , Motril , Lanxaron , &c.

(1) Variedad dedicada al Agrónomo romano PALADIO Rutilio , que habló tambien de los vidueños en su obra *De re rustica* , segun dixe en la pág. 116 .

CEDOTÍ , CEOTÍ y CEUTÍ. *ibid.*

LANXARON en Motril , Málaga y Capileyra.

SARMIENTOS postrados: HOJAS amarillentas: UVAS muy apiñadas medianas algo oblongas algo doradas muy duras algo agrias.

RAMIS prostratis: FOLIIS lutescentibus: ACINIS confertissimis mediocribus oblongiusculis subaureis durissimis subacidis.

VALENCÍ ó PALOP ó POLOP dulce. *Valcarc. loc. cit. pág 27?*

LANXARON. La Leña , *loc. cit. pág. 32.*

SARMIENTOS como en la Vigiriega comun , excepto que son broncos y echan muy pocos NIETOS.

HOJAS y CABILLO exâctamente como en la Vigiriega comun , excepto que aquellas suelen tener algunos pelos mas , algo entrelazados á veces en las inferiores formando ya borra ; caen de las ultimas.

RACIMOS muchos ó bastantes, muy grandes, sin *agracejo*. PEZON corto , muy correoso.

UVAS de siete líneas de largo y seis de grueso , casi iguales , bastante adelgazadas ácia la punta , muy obtusas, con la superficie igual , muy traslucientes , se desprenden del pezoncito fácilmente , bastante crugientes , muy carnosas , de sabor dulce remiso algo áspero y ácido , algo tardías , *venas* muy manifiestas : *hollejo* grueso. ANILLO muy marcado , compuesto de *glandulas* algo oblongas , de color pardo-rojizo subido.

*Observacion 1ª.* La uva de este vidueño que ápenas se dora en las parras suele en las viñas mancharse de un dorado sucio y fuerte por el lado que la baña el sol.

*Observacion 2ª.* Su hoja que en las parras tiene muy pocos pelos y muy sueltos , echa bastantes en las cepas y alguna vez entretexidos como borra. Como este accidente es muy raro no he vacilado un momento sobre colocar el vidueño en la seccion segunda sin embargo de que es bastante afine á algunos de la primera.

*Observacion 3ª.* En Lanxaron se han cogido racimos de esta variedad que pesaban diez y ocho libras, y se ha visto parra madre que con sus mugrones ó hijos , unidos

á ella todavía , ha dado un año hasta trescientas arrobas de uva.

*Observacion 4.<sup>a</sup>* Es muy afine á ella la variedad que cultivan en Madrid con el nombre de GUADALUPE y cita Fuentedueña en la pag. 292.

Es la mejor para colgar despues del Ataubí y la casta de Ohanez.

A este vidueño , con el Listan y Ataubí , debe principalmente su aspecto pintoresco , su riqueza y su celebridad el amenísimo pueblo de Lanxaron , cuyos vecinos lo venden en Granada , Motril y otros mercados.

En Málaga y Motril tienen de él algunas cepas , y en Granada algunas cepas y parras.

118. - CASTA DE OHANEZ. *BACCI* (1).

UVA BLANCA en Ohanez.

CASTA DE OHANEZ en Uxixar.

HOJAS amarillentas : UVAS muy apiñadas medianas casi cilíndricas algo doradas duras algo agrias.

*FOLIIS lutescentibus : ACINIS confertissimis mediocribus subcylíndricis subaureis duris subacidis.*

Solo difiere de la anterior por sus UVAS de seis líneas ó poco mas de largo con quatro de grueso , muy desiguales por lo comun , aun mas carnosas , muy tardías ( la criada en parras no madura hasta fines de Noviembre ).

*Observacion.* Esta preciosa variedad se llevó á Ohanez de un pueblecito inmediato llamado Rágol , donde la cultivan en un sitio muy ameno que llaman la Daira. En Ohanez ha mejorado todavía sus calidades haciéndose mas sabrosa y durable. Suelen dexarla en los parrales hasta Navidad y conducirla á Madrid y Cádiz sin que sufra sensiblemente en el transporte.

(1) Variedad dedicada al erudito Andres Baccio , que aunque mal Ampelógrafo , conoció la necesidad de esta ciencia y se esforzó á su manera en hacerla progresar. Véase su artículo en la pag. 118.

Aguanta colgada de un año para otro.

Este vidueño forma la cosecha principal de Ohanez que lo cultiva en parras con preferencia á todos los demás frutos, porque ningun otro le da tanta utilidad.

119. - NIEVASEA. *NIEVASEA* (1).

RACIMOS malos: UVAS grandes oblongas algo rojas duras un poquito ácidas sabrosas.

*ACINIS raris magnis oblongis rubellis duris subacidis sapidis.*

CEPA brota muy temprano.

SARMIENTOS pardo-rojizos, muy duros: cañutos cortos: *rebuscos* bastantes. NIETOS bastantes.

HOJAS como en la casta de Rágol.

RACIMOS medianos, de *gajos* largos, sin *agracejo*. PEZON muy duro.

UVAS del largo de ocho líneas y media con siete y media de grueso, casi iguales, obtusas, con la superficie igual, se desprenden del pezoncito muy fácilmente, bastante carnosas, muy tempranas: *hollejo* delgado.

La he observado en una parra del carmen de D. Simon de Argote en Granada.

(1) Llamo así á esta variedad en memoria del difunto Josef NIEVAS de Granada, que me la dió á conocer con algunas otras.

## ÍNDICE

### DE LOS TRATADOS CONTENIDOS

#### EN ESTE TOMO XXI.

**A**BEJERA: descripción de este vidueño, pág. 334.

Advertencia sobre el Ensayo de las variedades de la vid, I, 345.

**AGRACERAS:** descripción de cinco vidueños comprendidos en la tribu de este nombre, 366.

**AGRICULTURA:** observaciones sobre la de Jadraque, 217.

**ALBAN REAL**: descripción de este vidueño, 404.

**ALBILLOS**: descripción de seis vidueños comprendidos en la tribu de este nombre, 308; del Albillo loco, 320; del de Granada, 321.

**ALTURAS**: se determinan algunas del Reyno de Granada, respecto del nivel del mar, 38, 41.

**Analogía entre los vegetales y animales**. Véase Economía vegeto animal.

**ARITMÉTICA DE NIÑOS**: importancia de esta obra, 161, 183.

**BANDOS**: extracto de una Memoria de Mr. Cels sobre los que se publican para la recolección de los frutos, y principalmente para la vendimia, 93. Observaciones sobre dicha Memoria, 109, 135, 149, 170.

**BEBA**: descripción de este vidueño, 341.

**CABRIELES**: descripción de seis vidueños comprendidos en la tribu de este nombre, 384.

**CALONA**: descripción de este vidueño, 349.

**CAÑOCAZO**: descripción de este vidueño, 408.

**Carta sobre el uso del salvado**, 81, 106, 120. Id. sobre la digestión, 297, 313, 329.

**CASTA DE OHANEZ**: se describe este vidueño, 412.

**CEPA CANASTA**: descripción de este vidueño, 348.

**Censura de los AA.** que han escrito sobre las variedades de la vid comun, 112, 125, 144.

**CIENFUENTES**: descripción de este vidueño, 350.

**CIUTÍ**: descripción de este vidueño, 410.

**DATILERAS**: se describen siete vidueños comprendidos en la tribu de este nombre, 389, 395.

**DE BOUTELOU**: se describe el vidueño de este nombre, 400.

**DE COLUMELA**: descripción de este vidueño, 347.

**DIGESTION**: carta sobre esta función, 297, 313, 329.

**DORADILLO**: descripción de este vidueño, 350.

**Economía vegeto-animal**. Analogía que se encuentra entre las funciones de los cuerpos orgánico-vegetales, y las de los cuerpos orgánico-animales y consecuencias útiles que se pueden sacar de ellas para la Agricultura, 233, 261, 278, 290, 310.

**Ensayo sobre las variedades de la vid comun que vegetan en Andalucía**, 1, y se continúa en todos los números hasta el fin del tomo.

**Etimologías de varias voces españolas usadas en el Ensayo sobre las variedades de la vid**, 192.

**Exposición de los caracteres que pueden servir para distinguir las variedades de la vid comun**, 49 - 80, 84. Tablas sinópticas de ellos, 87-92. Uso que se ha hecho de ellos en el Ensayo sobre las variedades de la vid, 100. Observaciones sobre su constancia, 187 - 191.

**FERRARES**: descripción de seis vidueños comprendidos en la tribu de este nombre, 370.

**FIESTA RURAL**: noticia de la

- primera con que la Real Sociedad económica de Sanlúcar de Barrameda celebró la fundacion del Real Jardin experimental y el nombre de su ilustre Protector, 157. Reflexiones sobre las fiestas rurales con motivo de la anterior, 185, 201.
- FRAY GUSANO DE MAINA: descripcion de este vidueño, 349.
- GABARRO: observaciones sobre esta enfermedad y sobre los fluxos sinoviales, 281.
- GALANA: descripcion de este vidueño, 342.
- GALLEGA: descripcion de este vidueño, 325.
- GANADO LANAR: plan de los experimentos que para su mejora y la de otros animales útiles hacia el Profesor Daubenton en el Jardin botánico de Paris, 33.
- GARABATONA: descripcion de este vidueño, 339.
- HEBEN: descripcion de este vidueño, 353.
- HOSPICIO DE SOTO DE CAMEROS: noticia de este Establecimiento, 173.
- Introduccion al Ensayo sobre las variedades de la vid, 7.
- JAENES: descripcion del negro de Sevilla, 301; del negro de Granada, 302 y del blanco, 303. Observacion sobre los vidueños que se conocen con este nombre, *ibid.*
- JAMÍ: descripcion de este vidueño, 401.
- LISTANES: descripcion de seis vidueños comprendidos en la tribu de este nombre, 256, 273; del Listan de Paxarete, 353.
- LLORONA: descripcion de este vidueño, 324.
- MALVASIA: descripcion de este vidueño, 327.
- MANTÚOS: descripcion de ocho vidueños comprendidos en la tribu de este nombre, 284; del Mantío perruno, 352.
- Memoria sobre la tierra vegetal y sus abonos, 249, 265.
- MOLLARES: descripcion del Mollar negro 305; del Cano, 306; del negro bravío, 307; del de Cádiz, 326; del de Granada, 407.
- MONTUO CASTELLANO: descripcion de este vidueño, 343.
- MORRASTELL: descripcion de este vidueño, 340.
- MOSCATELES: se describen quatro variedades de Moscatel, 395, y el que llaman de Flándes en Granada, 405.
- NIEVASEA, descripcion de este vidueño, 413.
- Noticia de una nueva Escuela de economía rural establecida en Alfort por el Emperador de los Franceses, 36.
- Observaciones sobre el género vid y sus especies, y sobre las variedades de la comun, 146, 165, 179, 187. Sobre el Gabarro y sobre los fluxos sinoviales, 281. Sobre la Memoria de Mr. Cels de los bandos para la recoleccion de las cosechas, y principalmente sobre el abuso que resulta de la publicacion de semejantes bandos para la recoleccion de la aceytuna, 109, 135, 149, 170.
- PALOMINOS: descripcion del Palomino comun y del bravío, 276.

- PECHO DE PERDIZ**: descripción de este vidueño, 344.
- PERRUNOS**: descripción de cinco vidueños comprendidos en la tribu de este nombre, 361.
- Plan de los experimentos que para la mejora del ganado lanar y otros animales útiles hacia el profesor Daubenton en el Jardín botánico de París**, 33.
- Premios que ofrece la Real Sociedad económica de Soria**, 188, 198.
- RABO DE VACA**: descripción de este vidueño, 354.
- RATONES CAMPESINOS**: carta sobre el modo de destruirlos, 31.
- REBAZO**: descripción de este vidueño, 355.
- REGADÍO**: sobre el abuso de plantarlo de viña, 44.
- ROMÉ**: descripción de este vidueño, 338.
- RUIZIA**: se describe este vidueño, 407.
- SALVADO**: carta sobre su uso, 81, 106, 120.
- SANTA ISABEL**: descripción de este vidueño, 406.
- Secreto para dar color de oro á las obras de latón ó bronce**, 48; para pinturas de precio, *ibid.*
- SIERRAS PIZARROSAS**: se las compara con las de roca compacta, 43.
- Tablas sinópticas de las variedades de la vid comun**, 207, 224, 244.
- Tablas sinópticas de los caracteres de las variedades de la vid comun**, 87.
- TERANA**: se describe este vidueño, 403.
- Terrenos de Andalucía en que se cultiva la vid comun**, 17, 37.
- TETAS DE VACA**: descripción de cinco vidueños comprendidos en la tribu de este nombre, 375.
- TIERRA**: memoria sobre la vegetal y sus ábonos, 249, 265.
- TINTILLA**: descripción de este vidueño, 335.
- TINTO**: descripción de este vidueño, 337.
- TORNASOL**: sobre el cultivo y utilidades de esta planta, 141.
- VAOA**: se describe este vidueño, 406.
- VARIETADES DE LA VID COMUN.**  
 Ensayo sobre las que vegetan en Andalucía, 1, y se continúa en todos los números hasta el fin del tomo. Importancia de su estudio, 2, 8, 112, 148, 345. Exposición de los caracteres que pueden servir para distinguirlos, 49 - 80, 84. Observaciones botánico-agronómicas sobre ellas, 165-192.
- VERDAGÜILLA**: descripción de este vidueño, 322.
- VERDAL**: descripción de este vidueño, 323.
- VIGIRIBGAS**: descripción de tres vidueños comprendidos en la tribu de este nombre, 365-Vigiriego de Motril, 401.
- VIRGILIANA**: descripción de este vidueño, 341.
- UVA DE REY**: descripción de este vidueño, 409.
- XIMENEZ COMUN**: descripción de este vidueño, 357; del loco, 356; del Zumbon, 328.
- ZURUMÍ**: descripción de este vidueño, 346.







SEMANARIO  
DE  
AGRICULTURA

21

51/44