

SEMANARIO

DE AGRICULTURA Y ARTES

Del Jueves 9 de Abril de 1807.

Varias observaciones sobre la Agricultura de Jadraque.

(Por D. Esteban Boutelou).

Es la Villa de Jadraque cabeza de partido, ó de jurisdiccion pedanea, á la que están sujetos 38 pueblos. Depende para el pago de las reales contribuciones de la ciudad de Guadalaxara, distando de ella seis leguas, y otras tantas de la ciudad de Sigüenza, á cuyo obispado pertenece. Tiene 270 vecinos, y se halla situada en un barranco, dominado de siete cerros pelados por el lado de oriente y por el occidente; se ve no obstante un monte de encina, propio de Villanueva de Argecilla, que ocupa uno de estos cerros, casi al medio dia. Dista cerca de media legua por el lado del norte del rio Nares, que abunda en barbos, luinas, anguilas y algunas truchas.

Los caminos son cenagosos, é intransitables durante el invierno.

Se encuentran muchos manantiales de aguas en estos distritos, y la fuente que se halla en la plaza pública de la Villa es abundantísima, y proporciona riego fácil, aun en los años mas secos, á las muchas huertas que cultivan los naturales, y ocupan un espacio de seiscientas hanegas, ó fanegas de tierra de marco real.

Concurren todos los lunes del año al mercado público los de la comarca con comestibles y géneros servi-

bles, surtiendo de este modo de quanto necesitan á la villa de Jadraque y pueblos inmediatos. El *rastro* que hay el mismo dia surte de carne, sebo, caza, ternera y lechoncillos á los habitantes de aquel término. La utilidad de los mercados públicos es tan importante para la agricultura, que siempre se notará una ventaja considerable en los parages donde está establecida esta ordenanza, para dar salida á los frutos. El labrador percibe la utilidad de los portes, y el público logra la ventaja de tomar sin alteracion y de primera mano los géneros que necesita, y conduce el mismo cosechero.

Fuera de algunos texedores de lino y cáñamo, y algunos de paños y xergas, no hay ningun ramo de industria establecido para dar ocupacion á los brazos, que no se emplean en el cultivo.

La recoleccion de todos los frutos, y hasta la siega de los granos, están sujetos al bando. Ningun labrador puede empezar su siega hasta que los peritos nombrados para el reconocimiento de las mieses declaran que están los trigos y cebadas en sazon para segarse. Al paso que debe reprobarse tan extraña providencia municipal, merece que se alabe la que se publica en muchas ocasiones, para que no entren los ganados en los rastros, hasta que hayan espigado los vecinos mas infelices y necesitados; aprovechando aquel desperdicio que hubieran malogrado y atropellado los ganados. Parece un principio de humanidad muy justo, el que los pobres disfruten aquel desecho, que destrozan y desperdician en muchas partes los ganados, para el lucro de un solo rico propietario.

Sin embargo de que se observa aquella antigua práctica de sujetar los frutos á postura, se exceptuan de ella las producciones que crian los hortelanos de la tierra; siendo obligatoria solamente para los que traen á vender frutos de fuera. Se quejan comunmente los vecinos poco cuerdos de esta franquicia, sin reparar que la concurrencia es la que unicamente abarata los géneros; debiéndose promover ésta por todos los medios posibles, á efecto de lograr un surtido abundante.

Se cuentan 37 labradores en la villa de Jadraque; pero con tan escasos fondos que no merecen tal nombre. La mayor parte de las tierras de pan llevar son propias de fundaciones piadosas, capellanías, vínculos y mayorazgos, y están labradas por arrendamiento. No es pues de admirar la desproporción del número de labradores con la población, ni menos el lastimoso estado de la Agricultura, siendo cierto que nada le da mas fuerte impulso que la vista del propietario, cuya ausencia manifiesta la misma tierra labrada por arrendatarios.

Las principales cosechas consisten en trigo chamorro y candeal, en cebada caballar y tremesina, en escaña, avena y centeno. Se cogen asimismo yeros, garbanzos, guisantes y hortalizas.

Labran con mulas pequeñas, con caballos y con bueyes.

Siembran por Octubre y Noviembre, y la siega se empieza desde Junio. Las plantas de los garbanzos no las arrancan quando ya están sazonados estos, como es la práctica general, sino que las siegan. Puede valuarse por un quinquenio, que vale la fanega de trigo á 50 reales, la de cebada á 24, la avena á 16, y el centeno á 22 rs.

Desempeñan comunmente las maniobras del campo los jornaleros hijos del pueblo. Ganan estos en invierno treinta quartos, y en verano cinco reales¹; comiendo de ellos y manteniendo á sus familias, aunque con escasez. Es verdad que suelen cultivar algunos pedazos de huerta por su cuenta, y cogen muchas cebollas, patatas y judías, con cuyo auxilio pasan los inviernos.

La conduccion de las mieses se hace á cargas, por haber muy pocos carruages. Se ven precisados por esta causa á segar la mies alta, á efecto de que no arrastre; pero sin embargo, se sacuden las espigas en el transporte, y sueltan mucha parte del grano. Antes de empezar la trilla sacan toda la mies que conducen á la hera. No pro-

¹ En el verano de 1806 pagaron algunos para segar unos jornales de 18 rs. y daban de comer á los operarios.

curan abreviar la recoleccion y la trilla, sino que por una mal entendida economía quieren que los mozos asalariados por año executen su trilla, saca, limpia, y demas operaciones. Desperdician un tiempo precioso, y se exponen, no pocas veces con la dilacion, á los acasos de las tempestades y aguaceros, con pérdida y disminucion de sus cosechas.

Subdividen sus heredades en particiones muy pequeñas, sucediendo con frecuencia que labre un propietario una suerte de tres ó quatro surcos de extension. Es sumamente perjudicial una subdivision tan extremada de las tierras. Son estas pedregosas en lo general, áridas y de inferior calidad, y para labrarlas usan de arados gruesos y casi cilindricos, que llaman de *pico de gorrion*, á fin de que se gaste menos la reja con el roce de los cantos y guiño. Descantan las heredades con bastante esmero y cuidado.

Cada fanega de tierra se compone de dos medias de la de Avila, ó de 12 celemines; debiéndose advertir que son fanegas de puño y no de medida. Es muy engañoso este método de medir, y sujeto á error; pero se estila en muchos distritos de la península.

Puede computarse por quinquenio en 200000 arrobas de vino al año la cosecha de uva que se beneficia en Jadraque. El vino es tinto espeso, sobradamente malo y sin aguante; pero lo venden á buen precio por ser bodega inmediata á la sierra. Su comun precio es de 10 rs., pero hay años que lo venden hasta 22 rs.

Las castas ó variedades de la vid que cultivan son de muy inferior calidad, á cuya circunstancia puede atribuirse con fundamento el que sean los vinos tan inferiores. Comprueba tanto mas esta asercion el haberse mejorado en extremo el vino de algunos dos ó tres naturales, que han introducido las vides *garnachas* de Aragon, y ya venden el vino á 40 rs. la arroba.

La principal riqueza de Jadraque está en sus huertas y frutales. Tienen muy corta inteligencia en el manejo y arreglo de terrenos, y no demasiado conocimiento para cul-

tivar con mayor aprovechamiento las producciones que despachan para Madrid, por medio de los tratantes de Alcobendas. Surten estas huertas de hortalizas, no solamente á esta villa, sino tambien á Brihuega y pueblos comarcanos. Crian principalmente lechugas, ajos, cebollas, tomates, patatas, pepinos, berzas, repollos, escarolas, pocos cardos y menos apio, y ninguna coliflor ni broculis. Están por lo general los terrones de las huertas sin allanar ni aquartelar; regándolos por inundacion, de manera que se empantanar unos puntos, sin que alcance el beneficio del riego á otros. Fuera del desaliño y descrédito de semejantes prácticas, es grande el desprecio que resulta al colono. Cultivan en lomos angostos los melones, pepinos, tomates y calabazas; cuelgan de resultas los tallos á las caceras ó regueras, que nombran *badeñas*, y con el mal orden se inundan, mojan y *alegaman* las flores y frutos tiernos de estas plantas delicadas, con no pequeño desperdicio.

Los tratantes de Alcobendas ajustan la fruta por junto, determinándose á dar segun las castas los precios siguientes, graduados por quinquenio: las *peras de Roma* á razon de 26 rs. arroba; las *camuesas* á 18 rs., los *peros esperiegos* á 15 rs., los *peros pardos*, y *manzanas aguazuelas* y las *escandamias* á 14 rs., las *peras canueles* ó *de invierno*, las de *donguindo*, de *pan*, y de *higo ordinario* á 9 rs., las *peras de campanilla*, de *higo fino* y *bergamotas* á 12 rs. En quanto á las guindas, ciruelas, y otras peras de menos aguante, es difícil graduar su valor por ser mas necesario su breve y pronto despacho.

Cogen la fruta sin cuidado, la apalean y derriban á patadas, subiendo los jornaleros al árbol; magullándose, pudriéndose, y desperdiciándose mucha parte de resultas de tan mal método. Si alguna vez la guardan, la tienen amontonada en las cámaras, sin cuidado ni esmero, pudriéndose la mayor parte.

Se nota mucha analogía entre casi todas las variedades de frutales que se cultivan en Jadraque, y es tal su semejanza, que me hacen sospechar con justo motivo que to-

das son procedidas de un typo comun. Las castas de manzano se conocen con los nombres siguientes: Manzanos escandamios, aguazuelos, comunes de najaron, de najaron de carretilla, ojancos, peros de oña, pero rayado, pero dulce, pero pardo, pero esperiego, hotico de puerco, y camuesos.

Perales de verano con nombre de higo, higo fino¹, higo basto, de campanilla, verdal, valencianos, cermeños, mizcleros², moscatel³, bergamota temprana, de cincho, de longuindo y de cogolludo. Los nombres de los perales de invierno y otoño son los siguientes: de Roma⁴, de canuel, de la pieza, de cabeza de perro, de oreja de mulo, y mantequilla de oro de otoño. Distinguen con nombre de peruetanos á los perales silvestres.

Las variedades de ciruela se conocen con los nombres de resinosas, de bartolas, verdales, regañadas, francesillas, de frayle y almacénas.

Cultivan dos variedades de guindo con nombre de comunes y garrafales⁵; y dos de cerezos que nombran asimismo comunes y garrafales.

Ademas de los expresados frutales hay un solo melocoton en todo el término, que es muy corpulento y robusto, y pudieran multiplicar con facilidad todas las castas de abridor, pavías y albaricoques.

Varía el precio de los frutales en venta y arrendamiento, no habiendo regla cierta para estas valuaciones. No hay generalmente mas regla que la preocupacion y capricho. Hay peral que aprecian los del pueblo en 2500 rs. vn. y muchos en 1200 rs. Considero excesiva sobre manera semejante valuacion, atendido el corto precio de la leña del frutal, y computando los réditos de estos árboles por un decenio. Un capital de 2500 rs. gastado en un árbol debe rendir al seis por ciento 150 rs. anuales, y creo difícilmente que pueda dar de sí igual cantidad cada año el ma-

¹ De santo, ó moscatelillos, en Aranjuez.

² Morcatel de verano, en Aranjuez.

³ Reales de Aranjuez.

⁴ Angelicos de Aranjuez.

⁵ De Jadraque, en Aranjuez.

yor peral de Jadraque, deducidas costas. Se necesitan de diez y seis á diez y siete años para sacar aun á ese respeto el capital que se invirtió para la compra de aquel árbol. Considerando la vida de estos frutales, y el número de los que perecen en cada quinquenio, echaremos de ver que es mayor la probabilidad de perder en la compra de dichos frutales á razon de los precios exôrbitantes en que se aprecian, que no de que dexen utilidad al comprador. Un árbol muerto es un capital perdido, mayormente donde no tiene estimacion el combustible. Por esta causa debe graduarse su precio á fondo perdido, y los rendimientos deben ser mayores que quando queda el fondo permanente, ó vivo el capital.

Habiendo medido algunos árboles frutales de los mas corpulentos de Jadraque, tuvieron las siguientes dimensiones.

TRONCO. ALTURA. COPA.

quartas. dedos. quartas. quartas. dedos.

Manzano escandamio	...7...	...3...	...38...	...55...	...4...
Pero esperiego.	...9...	...0...	...46...	...53...	...0...
Peral de Roma.	...7...	...2...	...40...	...61...	...0...
Peral donguindo	...10...	...3...	...61...	...71...	...0...
Peral canuel.	...7...	...6...	...51...	...60...	...0...
Peral bergamota temprana.	...9...	...6...	...48...	...59...	...0...

El tronco manifiesta la circunferencia; la altura, la elevacion del tronco hasta la cima de la copa; la copa, el vuelo del árbol.

Carecen en Jadraque de viveros correspondientes para la replantacion de las faltas de su arbolado, y traen los pies inxertos de Arcos. Es verdad que dexan las sierpes de peral que nombran *guardaperos* para que espesen y llenen la arboleda. Limpian por mayor las sierpes, descuidando el arbolado que desatienden en lo general.

Enxertan pocas veces, y en este caso usan del enxerto de cañutillo y de pie de cabra. Lian y sujetan las puas con corteza de mimbre, y las embarran con tierra arcí-

llosa, con poco esmero, y sin cuidar demasiado en su preparacion. Las lluvias deshacen y lavan facilmente el barro, quedando así la pua expuesta á la intemperie. Les faltan instrumentos proporcionados para echar los inxertos.

Continuacion del Ensayo sobre las variedades de la vid comun.

47. MONTÚO CASTELLANO.

SARMIENTOS muy tiernos: UVAS medianas oblongas duras muy sabrosas blancas, con el hollejo delgado.

47. DUSSIEUX.

RAMIS tenerrimis: ACINIS mediocribus oblongis sapidissimis albis, cute tenui.

48. PECHO DE PERDIZ.

SARMIENTOS tiernos: HOJAS grandes: UVAS apiñadas medianas trasovadas de un dorado sucio duras muy carnosas.

48. PICTA.

RAMIS teneris: FOLIIS magnis: ACINIS confertis mediocribus obovatis spurco-auratis duris carnosissimis.

49. ZURUMÍ.

SARMIENTOS muy tiernos: HOJAS medianas verde-amarillentas: RACIMOS algo ralos: UVAS medianas un poco oblongas blancas algo duras muy sabrosas tardias; con el hollejo delgado.

49. BIPARTITA.

RAMIS tenerrimis: FOLIIS mediocribus viridi-luteis: ACINIS rariusculis mediocribus oblongiusculis albis subduris sapidissimis serotinis, cute tenui.

50. DE COLUMELA.

SARMIENTOS tendidos largos tiernos delgados: HOJAS de un verde obscuro: RACIMOS grandes: UVAS algo apiñadas grandes casi redondas blancas duras.

50. COLUMELLÆ.

RAMIS prostratis longis gracilibus teneris: FOLIIS obscure viridibus: RACEMIS magnis: ACINIS subconfertis magnis subrotundis albis duris.

51. CEPA CANASTA.

SARMIENTOS tendidos algo gruesos: HOJAS con senos agudos y dientes cortos: RACIMOS pequeños entre cilíndricos y algo globosos: UVAS apiñadas redondas blancas blandas.

52. CALONA.

RACIMOS ralos: UVAS grandes casi redondas blancas blandas algo agrias tempranas.

53. FRAY GUSANO
DE MAINA.

HOJAS casi redondas casi enteras, con dientes muy cortos, blandas verde-amarillentas: RACIMOS pequeños: UVAS trasovadas muy blandas.

54. CIENFUENTES.

SARMIENTOS tendidos muy largos algo aplastados por la base, tiernos: HOJAS grandes, con senos acorazonados, verde-amarillentas: RACIMOS pequeños: UVAS muy redondas blancas blandas dulces.

55. DORADILLO.

SARMIENTOS tendidos muy broncos: UVAS muy apiñadas medianas algo trasovadas muy doradas duras ásperas.

56. MONTÚO PERRUNO.

SARMIENTOS tendidos muy bron-

51. PROLIFERA.

RAMIS prostratis crassiusculis: FOLIIS acutè sinuatis breviter dentatis: RACEMIS parvis cylíndrico subglobosis: ACINIS confertis rotundis albis molli-
bus.

52. COLONIA.

ACINIS raris magnis rotundiusculis albis mollibus subacidis præcocibus.

53. ROTUNDIFOLIA.

FOLIIS suborbicularibus subintegrè brevissimè dentatis mollibus viridi-luteis: RACEMIS parvis: ACINIS obovatis molli-
simis.

54. SUBCOMPRESSA.

RAMIS prostratis longissimis basi subcompressis teneris: FOLIIS magnis cordato-sinuatis viridi-luteis: RACEMIS parvis: ACINIS rotundissimis albis mollibus dulcibus.

55. AURANTIA.

RAMIS prostratis valde fragilibus: ACINIS confertissimis mediocribus subobovatis auratis-
mis duris austeris.

56. CANINA.

RAMIS prostratis valde fragili-

cos : HOJAS medianas verde-amarillentas : UVAS muy apiñadas medianas redondas muy doradas duras ásperas.

57. LISTAN DE PAXARETE.

SARMIENTOS delgados manchados por la base, muy broncos, con los cañutos cortos : HOJAS pequeñas, con los dientes puntiagudos, amarillentas : RACIMOS ralos : UVAS medianas muy redondas blancas duras carnosas dulces.

58. HEBEN.

SARMIENTOS erguidos lustrosos duros : HOJAS con senos casi agudos y dientes cortos, verde-amarillentas : RACIMOS muy ralos largos, con el pezon muy quebradizo : UVAS desiguales redondas doradas carnosas ásperas tardias.

59. RABO DE BACA.

SARMIENTOS casi tendidos largos algo broncos : HOJAS muy grandes, con la borra caediza : RACIMOS ralos : UVAS doradas carnosas ásperas.

60. REBAZO.

SARMIENTOS tiernos : HOJAS grandes borrosas ó algo pelosas : UVAS redondas de un dorado sucio duras ásperas.

bus : FOLIIS mediocribus rotundis auratissimis duris austeris.

57. PAUPERRIMA.

RAMIS gracilibus inferne maculatis valde fragilibus, internodiis brevibus : FOLIIS parvis acuminato-dentatis lutescentibus : ACINIS raris mediocribus rotundissimis albis duris carnosiss dulcibus.

58. FRAGILIS.

RAMIS erectis nitidis duris : FOLIIS subacutè sinuatis breviter dentatis viridi-luteis : RACIMIS longis, pedunculo valde fragili : ACINIS rarissimis inæqualibus rotundis aureis carnosiss austeris serotinis.

59. MACROPHYLLA.

RAMIS subprostratis longis subfragilibus : FOLIIS maximis, tomento deciduo : ACINIS raris aureis carnosiss austeris.

60. IGNOBILIS.

RAMIS teneris : FOLIIS magnis tomentosis subpilosisve : ACINIS rotundis spurco-auratis duris austeris.

SECCION SEGUNDA.

HOJAS pelosas.

FOLIA pelosa.

TRIBU VII.

XIMENECIAS.

XIMENECIÆ.

SARMIENTOS erguidos ú horizontales: HOJAS con senos agudos verde-amari-
llentas algo pelosas: UVAS algo apiñadas medianas blancas.

RAMI erecti aut horizontales:
FOLIA acutè sinuata viridi-
lutea subpilosa: ACINI sub-
conferti mediocres albi.

61. XIMENEZ LÓCO.

61. FORSTTHIA.

SARMIENTOS horizontales.

RAMIS horizontalibus.

62. XIMENEZ.

62. XIMENECIA.

SARMIENTOS erguidos.

RAMIS erectis.

TRIBU VIII.

PERRUNOS.

FLAVENTES.

SARMIENTOS duros ó broncos: HOJAS de un amarillo de laton: UVAS apiñadas medianas casi redondas.

RAMI duri aut fragiles: FOLIA
flavicantia: ACINI conferti
mediocres subrotundi.

63. PERRUNO COMUN.

63. FLAVA.

SARMIENTOS muy broncos: pezón fragil: UVAS de color amarillo de laton duras.

RAMIS valde fragilibus: pedun-
culo fragili: ACINIS flavis du-
ris.

64. PERRUNO NEGRO.

SARMIENTOS muy broncos: *pe-*
zon fragil: UVAS negras duras.

65. QUINTINIEA.

SARMIENTOS muy broncos: *pe-*
zon duro: UVAS negras algo
duras.

66. BERNALA.

SARMIENTOS muy broncos: UVAS
negras blandas.

67. PERRUNO DURO.

SARMIENTOS algo duros: HOJAS
muy peludas: UVAS blancas
duras.

64. ROZIERII.

RAMIS *valde fragilibus*: pedun-
culo *fragili*: ACINIS *nigris du-*
ris.

65. QUINTINIEA.

RAMIS *valde fragilibus*: pedun-
culo *duro*: ACINIS *nigris du-*
riusculis.

66. BERNALA.

RAMIS *valde fragilibus*: ACINIS
nigris mollibus.

67. FIRMISSIMA.

RAMIS *duriusculis*: FOLIIS *hir-*
sutissimis: ACINIS *albis du-*
ris.

TRIBU IX.

VIGIRIEGOS.

PROSTRATÆ.

SARMIENTOS postrados muy
tiernos: HOJAS amarillen-
tas: UVAS grandes blan-
das.

68. VIGIRIEGA COMUN.

UVAS casi redondas blanco-ver-
dosas.

69. VIGIRIEGA NEGRA.

UVAS negras.

70. DE BIDET.

UVAS oblongas blanco-verdo-
sas.

RAMI *prostrati tenerrimi*: FO-
LIA *lutescentia*: ACINI *mag-*
ni molles.

68. PROSTRATA.

ACINIS *subrotundis albo-viridi-*
bus.

69. CATONIS.

ACINIS *nigris*.

70. BIDE TI.

ACINIS *oblongis albo-viridibus*.

TRIBU X.

AGRACERAS.

OXICARPÆ.

HOJAS de un verde obscuro:
UVAS medianas redondas,
ó muy grandes y algo
alargadas, algo acidas.

FOLIA intensè viridia : *ACINI*
mediocres rotundi, aut ma-
ximi oblongiusculi, subaci-
di.

71. BLANQUECINA.

71. ALBICANS.

SARMIENTOS blanquizcos duros:
RACIMOS medianos : UVAS
medianas negras tardias.

RAMIS albicantibus duris: RACE-
MIS mediocribus : ACINIS se-
rotinis.

72. DE SOTO.

72. SOTTI.

SARMIENTOS blanquizcos : RA-
CIMOS algo oblongos : UVAS
medianas negras tardias.

RAMIS albicantibus duris : RACE-
MIS oblongiusculis : ACINIS me-
diocribus nigris serotinis.

73. MELONERA.

73. VITTATA.

UVAS negras con fajas negro-
grises.

ACINIS nigris nigro-griseo-fas-
ciatis.

74. AGRACERA.

74. FLORENTISSIMA.

Pezon muy tierno : UVAS muy
grandes negras.

Pedunculo tenerrimo : ACINIS
maximis nigris.

75. LANGLEYA.

75. LANGLEYA.

Pezon negro muy correoso : UVAS
muy grandes negras.

Pedunculo nigro valde flexili:
ACINIS maximis nigris.

TRIBU XI.

FERRARES.

PERGULANÆ.

SARMIENTOS tendidos : HO-
JAS de un verde-amari-
lento : UVAS poco apiña-
das redondas duras sabro-
sas.

RAMI prostrati : FOLIA viridi-
lutea : ACINI subconferti ro-
tundi duri sapidi.

76. FERRAR COMUN.

SARMIENTOS tiernos: UVAS muy grandes casi negras.

77. FERRAR BLANCO.

SARMIENTOS tiernos: UVAS muy grandes blancas.

78. JETUBÍ LOCO.

SARMIENTOS duros: UVAS muy grandes negruzcas.

79. CALONA NEGRA.

UVAS medianas obtusas negras.

80. ZUCARÍ.

UVAS medianas umbilicadas negras.

81. MELCOCHA.

UVAS grandes doradas.

76. AUTUMNALIS.

RAMIS teneris: ACINIS maximis subnigris.

77. SPECIOSA.

RAMIS teneris: ACINIS maximis albis.

78. JONESIA.

RAMIS duris: ACINIS maximis nigricantibus.

79. EXQUISITA.

ACINIS mediocribus obtusis nigris.

80. SACCHARATA.

ACINIS mediocribus umbilicatis nigris.

81. MELLITA.

ACINIS magnis aureis.

TRIBU XII.

TETAS DE VACA.

BUMASTI.

UVAS muy grandes aovado-subcónicas.

ACINI maximi ovato-subcónici.

82. LEONADA.

82. SULCATA.

UVAS umbilicadas sulcadas rojas.

ACINIS umbilicatis sulcatis rubris.

83. CORAZON DE CABRITO.

83. EXSUCCA.

HOJAS poco pelosas: UVAS negras.

FOLIIS subpilosius: ACINIS nigris.

84. MARTINECIA.

84. MARTINECIA.

UVAS aovadas algo doradas.

ACINIS ovatis subaureis.

85. SANTA PAULA
DE GRANADA.

85. LONGISSIMA.

UVAS adelgazadas por ambas
extremidades blancas.ACINIS utrinque attenuatis al-
bis.

86. CASCO DE TINAJA.

86. MACROBOTRYS.

HOJAS pelosas ó algo borrosas:
UVAS negras.FOLIIS pilosis subtomentosisque:
ACINIS nigris.

TRIBU XIII.

CABRIELES.

OLEAGINEÆ.

HOJAS de un verde obscuro:
UVAS medianas ó gran-
des oblongas duras áspe-
ras, ó muy grandes y sa-
brosas.FOLIA intensè viridia: ACINI
mediocres aut magni oblon-
gi duri austeri, seu maximi
sapidi.

87. CABRIEL.

87. RUBRA.

SARMIENTOS blanquizcos con
fajas longitudinales rojas
tiernos: dientes de las HOJAS
cortos: UVAS medianas ó
grandes negras.RAMIS albicantibus longitudina-
liter rubro-fasciatis teneris:
FOLIORUM dentibus brevibus:
ACINIS mediocribus magnisque
nigris.

88. JETUBÍ BUENO.

88. PLINIANA.

SARMIENTOS algo duros blan-
quizcos: dientes de las HOJAS
cortos: UVAS medianas negras.RAMIS albicantibus duriusculis:
FOLIORUM dentibus brevibus:
ACINIS mediocribus nigris.

89. ATAUBÍ.

89. PRÆDURA.

UVAS muy grandes verdes.

ACINIS maximis viridibus.

90. SANTA PAULA
DE XEREZ.Pezon rojo : UVAS muy grandes
rojas.

91. MORAVITA.

Pezon verde : UVAS muy gran-
des negras.

92. ARROBAL.

UVAS medianas rojas.

90. PRÆGRANDIS.

Pedunculo rubro : ACINIS maxi-
mis rubris.

91. GARIDELI.

Pedunculo viridi : ACINIS maxi-
mis nigris.

92. OVATA.

ACINIS mediocribus rubris.

TRIBU XIV.

DATILERAS.

SARMIENTOS postrados :
UVAS delgadas oblongas
algo duras.

93. DE RAGOL.

UVAS rojas.

94. TETA DE VACA
NEGRA.HOJAS de un verde obscuro :
UVAS medianas negras.

95. TETA DE NEGRA.

UVAS grandes negras.

96. TETA DE VACA
BLANCA.SARMIENTOS muy cortos : RACI-
MOS cortos ralos : UVAS blan-
cas.

DACTYLIDES.

RAMI prostrati : ACINI graci-
les oblongi duriusculi dulces.

93. DACTYLUS.

ACINIS rubris.

94. TENERA.

FOLIIS obscure viridibus : ACI-
NIS mediocribus nigris.

95. TERETIUSCULA.

ACINIS magnis nigris.

96. GRACILIS.

RAMIS brevissimis : RACEMIS bre-
vibus : ACINIS raris albis.
Se continuará.