

Martínez-Zaporta, 9.-Aparado, 23.-Lugoño

Hace unos meses el que suscribe publicó en «ABC» una crónica con el título «Los retratos de Cienanos», en la que se exhibían algunos cuadros en los que aparecía su effigie en tres épocas de su vida—juventud, madurez y vejez—y que, a decir verdad, ninguna belleza varonil superlativa demostraban digna de su fama universal e histórica de conquistador y fascinator de mujeres durante el tiempo transcurrido desde su actuación «donjuanesca» y las relativas garantías de autenticidad de esos retratos se hace difícil asevera que él así fue, y que a pesar de no ser un Adonis lindara a las bellezas de su modo de vivir y de su linaje.

Indudablemente poseyó un secreto—aparte de su física osadía—que no nos revela en sus Memorias. Y que por tanto no sabemos si era mental, sentimental o físico. Pero en cambio nos encontramos hoy en día a Caliz de la Cruz que retrató «sus éxitos y al que podemos analizar de cerca porque tenemos delante

su fotografía y sus efímeras se insertan en la Prensa.

Se trata de Porfirio Rubirosa, el diplomático dominicano que ha conquistado nuestro matrimonio con la baronesa Hutter de los Andes, el cuallo excentrico que a la vez se el cuantio marido que no mereca, después de desligada de sus cuatro anteriores esposas el príncipe Alexis Mdivani, el danés conde Reventot, el actor de cine Gary Cooper y el ruso príncipe Igor Troubetzkoy.

A su vez Rubirosa, estuvo casado con una hija del generalísimo Trujillo con la estrella francesa Danielle Darrieux y con la reina norteamericana del tabaco Doris Duke. Y a incluir a la penúltima Eiza Zsa Zsai, que mecen a su hijo, pero sido su predilecta «mamá» así, tándose el Registro D-1. (Entre paréntesis, esta confesión escandalosa merece benévola acogida, porque por lo menos está exento de esa grotesca hipocresía que caracteriza a esas mujeres que

(Pasa a la segunda página)

Casanova

Por Federico Olván

su fotografía y sus alturas se insertan en la Prensa.

Se trata de Federico Rubirosa, el diplomático dominicano que ha conquistado cuatro reinados: con Bárbara Hutton, la multimillonaria exótica; con la vez es el quinto marido que se le vea, después de desligada de sus cuatro anteriores esposas; el príncipe Alexis Mdivani, el danés conde Revontier, el actor de cine Gary Grant y el ruso príncipe Igor Troubetzkoy.

A su vez, Rubirosa, estuvo casado con una hija del generalísimo Trujillo, con la estrella francesa Danielle Darrieux y con la reina norteamericana del tabaco Doris Day, sin incluir a la primera dama, Zsa Zsa Gabor, que tampoco se ha podido su predilecta "mamá", al no estar el Registro N.º 1, entre paréntesis, esta confesión escandalosa merece benévola acogida, porque por lo menos está exento de esa grotesca hipocresía que caracteriza a esas mujeres de

(Pase a la segunda página)

DEL AGRO Y EL GANADO

Cuando la patata «degenera»

Importancia de evitar la disminución de la vitalidad del tubérculo y la creciente merma en las cosechas

Al ingeniero agrónomo don J. J. Fernández Urquiza le es debido el trabajo que, sobre «La degeneración de la patata y medios para combatirla», hemos de reproducir en sus partes esenciales, toda vez que su oportunidad está justificada por ser cultivo al que nuestra provincia dedica no poca superficie de su agro, y la importancia de su consumo. El «plato de patatas» es la aspiración alimenticia de los pobres y modestos, muy generalizada en nuestras latitudes, pero no frías, en puré «esplandido», o en patatas fritas, entre otras cosas, los conquistadores del Nuevo Mundo, honran las mesas más selectas, para que en ellas les haga honor el apetito.

He aquí lo que el señor Fernández Urquiza dice: «Una merma de gran volumen en las cosechas patateras la más importante de todas, se debe a la enfermedad denominada «degeneración», que consiste en una pérdida de vitalidad de las sucesivas producciones anuales obtenidas sin cambio de simiente, pérdida que se traduce en una disminución cada vez mayor del rendimiento de tales cosechas.

Esta calamidad, bien conocida de todos los patateros, se suele combatir sembrando la simiente, es decir, plantando tubérculos que se llevan de cosechas acreditadas en la producción de lo que gráficamente se denomina «patata de siembra», en vez de seguir empleando patatas de la propia producción o de la propia comarca.

Mas como tales tubérculos tienen siempre los altos precios que corresponden a productos de calidad, conviene al agricultor conocer algún procedimiento para que, no tenga que «cambiar» la simiente con demasiada frecuencia, sino de tarde en tarde o en cantidades notoriamente menores a las que cada año venga comprando. Veamos cómo.

CAUSAS DE LA «DEGENERACIÓN»

Está comprobado experimentalmente que la llamada «degeneración» es, en realidad, debida a enfermedades de las llamadas técnicamente «virosis».

Tal denominación se debe a que los agentes que producen esas enfermedades son unos «virus» que, al producirse o desarrollarse dentro de las plantas, las hacen enfermar y, por lo tanto, degenerar.

Estos «virus» se han podido aislar de las plantas enfermas, habiéndose comprobado sus efectos dañinos, porque, introducidos en las plantas sanas, producen las mismas enfermedades que tenían las plantas de donde se extrajeron.

Interesa saber que tales «virus» atacan también, reduciendo sus rendimientos, a otras plantas distintas que la patata, como, por ejemplo, a las alubias, tomates, tabaco, etc.

SINTOMAS

Cada clase de «virus» produce síntomas distintos en las plantas atacadas; pudiendo señalar como importantes para la patata los siguientes:

1. Arrollamiento de las hojas, que se ponen rígidas y como apergamadas, enrollándose hacia arriba, abarquillándose.
2. Manchas amarillentas entre las nervaduras de las hojas, de tonos muy diversos, dándolas aspecto como de mosaico.
3. Ennegrecimiento de las venas, y aun de los peciolo o cabos de las hojas, las cuales llegan a morir, empezando por las más bajas.

4. Hojas arrugadas y como rizadas que dan a las matas un aspecto escatolado.

5. Hojas menores que las corrientes, que nacen muy próximas entre sí, con entrenudos cortos, con los que los pies de patata tienen el aspecto de plantas enanas.

Estos síntomas pueden presentarse solos o agrupados en la misma planta o hasta combinados, como, por ejemplo, el que se llama «rizado», más acusado que el arrollamiento, y en otras comarcas se conoce con el nombre de «arrellado».

Los síntomas aludidos pueden confundirse con otros similares ocasionados por enfermedades o plagas distintas de las «virosis», pero, en tal caso, se pueden presentar en corros o manchones, afectando a todas las plantas de una parte de la parcela o a la parcela entera. Mientras que en los casos de ser producidos por «virus» se encuentran salpicadas las matas atacadas y las sanas o aparentemente sanas.

En caso de duda será conveniente prescindir de la producción dudosa cuando se trate de aprovecharla como «patata de siembra».

DAÑOS

Los daños producidos por estas «virosis» son consecuencia de las anomalías que ocasionan en el desarrollo vegetativo de las matas de patata, las cuales, en ocasiones, ni siquiera llegan a formar los tubérculos, aunque en todos los casos disminuyen las cosechas.

Y, lo que es aún peor, transmiten sus «virus» dañinos para el rendimiento (que no, para la alimentación) a las cosechas siguientes, pudiendo contagiar a las patatas sanas con las que tengan contacto.

TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD E INFLUENCIA DEL CLIMA

Acabamos de indicar que puede hacerse por roce de unos tubérculos con otros enfermos, o con las plantas atacadas o con herramientas empleadas en patateras enfermas. Además se propaga por los pulgones verdes que se alimentan de plantas dañadas y pasan a las sanas, así como por otros insectos (cigarras, chinches de campo, etc.).

Pero el principal medio de difusión de estas enfermedades está en el empleo de simiente «viciosa».

De donde se deduce la grandísima importancia de emplear «patata de siembra» sana, ante todo y sobre todo.

Está comprobado que los «virus» se desarrollan y se propagan con diferente intensidad en unos climas o en otros. En las regiones cálidas se propagan con gran intensidad y se desarrollan con gran rapidez, mientras que en las regiones montañosas lo hacen menos intensamente y con más lentitud. Aunque esta afirmación no es tan contundente como para que llague a aceptarse en absoluto, pues puede haber, y hay, algunas zonas bajas que dan buena «patata de siembra».

Mas, en general, la buena «patata de siembra» se consigue en nuestra Patria en zonas montañosas, como, por ejemplo, La Cebeda, de León; La Valdivia, de Palencia; La Lora, de Burgos, etc.

MEDIOS DE LUCHA

Expuestas ligeramente las precedentes consideraciones, se explica bien que el procedimiento más sencillo (y ciertamente eficaz) para luchar contra la «degeneración» de la patata es plantar simiente nueva, procedente de zonas acreditadas, en las que se esogen tubérculos sanos o que tienen los «virus» en proporción apenas apreciable. La experiencia justifica los buenos resultados de tal procedimiento.

Mas, además, cabe emplear también los siguientes sistemas:

En un terreno corriente cultivado de patata hay entremezcladas plantas atacadas y plantas sanas, siendo raro que todas estén contagiadas (al menos en el clima y tierras leonesas), por lo que cabe elegir una parcela para obtener nuestra propia simiente, escogiendo la que presente matas en que sea mínima la propagación de pies con los síntomas que hemos expuesto al principio de este escrito.

En tal parcela debe procederse al arranque de las plantas enfermas.

El arranque debe practicarse, conforme justifica la experiencia, en dos ocasiones al menos. La primera vez, cuando las matas tienen unos 20 centímetros de altura; la segunda vez debe hacerse un mes después. Y, además, para mayor eficacia, en el momento de cosechar deben eliminarse también los tubérculos de los pies que den poca producción o que presenten tubérculos que no tengan buen aspecto, o estén con deformaciones u otras anomalías.

Este sistema puede todavía perfeccionarse actuando como se indica seguidamente:

Selección en verde o en pie. En la parcela elegida para obtener la simiente, al proceder al primer arranque de matas, deben señalarse con estaquillas o pequeños tutores los pies que se presenten más vigorosos y de mejor color.

Al proceder al segundo arranque

La venta, al por mayor de granos para piensos está muy encaimada en Castilla

Los mercados mayoristas de granos continúan muy encaimados. La paralización ocedece a la inseguridad de si se va a importar más cebada o se va a destinar ante la abundancia de existencias en el Servicio sin disponer ni aplicar, pero, además, mantiene esta duda y el retraimiento a comprar pienso, el hecho de anunciarse como rumor, aunque sin confirmarlo oficialmente, de importación de 50.000 toneladas de maíz de la Argentina. Suponemos que no se verificará esta importación, pero de confirmarse, se el rumor, creemos que las informaciones se han dado confundidas en un caso a la derecha, pues no creemos que Argentina envíe, por ahora, mayor cantidad que 5.000 toneladas, y ya está bien; pero 50.000 toneladas, que son cinco mil vagones, a estas alturas con pastos abundantes y con los granos de pienso en baja, a la verdad no lo esperamos.

En el mercado, dentro de la paralización de negocios, se nota cierta tranquilidad en la espera por

de matas enfermas, se quitarán las estaquillas de los pies que no sigan sobresaliendo por su excelente aspecto.

Y al morir el patatero, se comenzará la recolección por la de los pies que hayan quedado señalados, pero recordando la advertencia ya dicha, de que no se recojan para simiente los tubérculos deformados, etc. ni los procedentes de matas poco productivas.

Los tubérculos así eliminados se dejan sobre el terreno para cuando se haga la recolección en seco. Y sólo se guardarán para simiente los procedentes de pies con estas dos condiciones: sanos y productivos.

Mas aún cabe poner en ejecución otra práctica para luchar con eficacia contra la «degeneración», conforme explicamos a continuación:

Plantación con tubérculos prebrotados.

La simiente obtenida conforme a lo acabado de indicar debe guardarse en las debidas condiciones de almacenamiento hasta que unos veinte días antes de la «siembra» se la extienda sobre unas superficies expuestas a la luz del día, después de trocearla convenientemente, si el tamaño de los tubérculos así lo aconseja.

Recordemos que cuando se parte la patata de siembra para su plantación debe hacerse a lo largo, de manera que en cada trozo haya yemas fértiles («ojos» o «nudos») capaces de brotar.

Así iluminados los tubérculos de siembra, además de verdearse —lo que aumenta sus defensas— y de crearse los cortes de los que se hayan partido —con lo que cicatrizan tales cortes—, se podrá proceder a separar los que no brotan —que habrían dejado maras perjudiciales en el terr— o los que echan hilos en vez de brotes cortos y gruesos —con lo que además lucharemos contra otra enfermedad: la filoxera—, quedándonos para la plantación con aquellos tubérculos que nos den la seguridad de que, habiendo producido brotes bien conformados (gruesos y cortos), continuarán su desarrollo al colocarlos en el terreno, de manera que dichos brotes produzcan matas vigorosas, y, además, asomarán a la superficie del terreno con algún adelanto respecto a las plantaciones hechas al uso corriente.

RESUMEN

En resumen, todo agricultor puede mejorar el rendimiento de sus cultivos de patata empleando simiente de calidad, que deberá renovarse cada tres o cuatro años, o antes, si se nota rápido descenso de rendimiento en sus producciones.

Para retrasar tal renovación, cabe aminorar la velocidad de la «degeneración» cuidando de producir nuestra propia simiente en finca bien atendida en la que arranquemos cuantas matas aparezcan enfermas o dudosas, y en las que recojamos separadamente los tubérculos producidos por pies que se hayan destacado desde la nacimiento, hayan mantenido excelente aspecto y presenten producción sana y abundante.

De tales tubérculos se plantarán solamente los que, expuestos a la luz en la época conveniente, hayan producido brotes gruesos.

LOS MERCADOS Y SUS PRECIOS

Fareos que reaccionan algo los precios, cosa que era de esperar, en cuanto la cosecha fue encerrada, y como cada día se consumen más, no es de extrañar que se note una demanda bastante activa, pese a la calma general de negocios. El consumo patatero tiene mucha capacidad en España, por lo que es de suponer que este año se planten muchas en los regadíos. Las ofertas que vienen son las corrientes a granel, a 1'05, y las escogidas, a 1'10, 1'15 y 1'20 en líneas de Burgos, Palencia, Alava y Navarra. En el Centro y Mancha se opera de 1'30 a 1'40 en estaciones cercanas a Madrid, y en Cataluña de 1'30 a 1'40.

parte de los labradores para ver si consiguen mayores precios por que dicen que para vender en baja tiempo tendrán, y que como se ha cogido poca cebada, tiene que valer. Y esperan.

Las últimas operaciones mayoristas que se han cerrado han sido a 3'40 con saco en líneas de Castilla, habiendo alguna oferta, y no mucha, a 3'50 en Extremadura, de buena calidad.

La avena, algo más movida porque se está en la época de siembra en Castilla, ya que dice el refrán: «Si quieres ser avenero, siembra en febrero», se opera alrededor de 3'30 a 3'40 con saco en estaciones de origen.

Los yeros y algarrobos no se venden, porque hay pocas necesidades que atender, pues las vacas lecheras con el maíz y la pulpa azucarera van muy bien. El maíz está movido, pero con mucha expectación sobre si vendrá o no vendrá argentino, redondeándose el fino andaluz de secano, a 4'10 con saco; los de regadío, a 3'80, y los híbridos, de 3'50 a 3'60 en estaciones de origen. Las habas se sostienen de 4'60 a 4'70. Las mazanas buenas extremas y las andaluzas anchas se ceden a 4'90 con saco las superiores caballares.

La paja está algo más sostenida, porque al empezar a padecer sequías, se ha iniciado alguna demanda; la de trigo, a 1'125 la paja de 20 a 22 kilos, y las de jembibre a 23 pesetas la paja de 20 a 23 kilos en estaciones castellanas.

Los salvados están muy ofrecidos

EL CULTIVO DEL MAIZ EN LA PROVINCIA

Variedades de híbridos dobles de maíz producidos por las distintas entidades para el año en curso

Dado el gran interés que ha despertado en la provincia el cultivo de las variedades de maíz de híbridos dobles, publicamos relación de las que para 1954 tiene dispuestas el Instituto Nacional de la Producción de Semillas Selectas:

AGROFI (Plaza de la Mancha 14 Madrid)

VARIEDADES: Clyde B-10 (P); Clyde B-23 (SP); Maygold 99 A (SP); Clyde B-60 (M); Clyde B-53 (MD); Maygold 59 A (ST); Clyde B-31 (T); Maygold 39 (T); Clyde B-100 (MT); Clyde B-101 (MT).

Los yeros y algarrobos no se venden, porque hay pocas necesidades que atender, pues las vacas lecheras con el maíz y la pulpa azucarera van muy bien. El maíz está movido, pero con mucha expectación sobre si vendrá o no vendrá argentino, redondeándose el fino andaluz de secano, a 4'10 con saco; los de regadío, a 3'80, y los híbridos, de 3'50 a 3'60 en estaciones de origen. Las habas se sostienen de 4'60 a 4'70. Las mazanas buenas extremas y las andaluzas anchas se ceden a 4'90 con saco las superiores caballares.

La paja está algo más sostenida, porque al empezar a padecer sequías, se ha iniciado alguna demanda; la de trigo, a 1'125 la paja de 20 a 22 kilos, y las de jembibre a 23 pesetas la paja de 20 a 23 kilos en estaciones castellanas. Los salvados están muy ofrecidos

La alfalfa ha bajado algo, cediéndose de 1'40 a 1'60, según procedencias, en paces bien hechas con alambre, las garrofas flojean, ofreciéndose a 1'65 la troceada y 1'45 la triturada o molida con saco en estaciones de origen. Las entradas de trigo en el Servicio van animándose de día en día, por lo que las fábricas han de trabajar bastante.

Los cursillos agropecuarios del pasado año

Su número se aproxima a cuatrocientos

Ingenieros agrónomos, veterinarios, peritos agrícolas y obreros técnicos han formado los cuadros del profesorado de los 390 cursillos agropecuarios realizados en España durante el pasado año de 1953. A 25.630 se ha elevado el número de los participantes de las provechosas enseñanzas, advirtiéndose que a partir de 1948 en que se iniciaron, habiéndose dado cinco cursillos a un total de ciento quince alumnos, el número de concurrentes se ha ido acrecentando de año en año en progresión casi geométrica.

Los celebrados en 1953 por la especialización a que se dedicaron, fueron así distribuidos:

Maquinaria, 41; enología, 39; plagas del campo, 39; fruticultura, 18; abonos, 17; forestal, 13; poda e injertos, 12; regadíos, 10; cultivo de secano, 8; agricultura en general, 3; horticultura, 3; gran cultivo, 2; arboricultura, 2; cultivo de la patata, 2; sericultura, 1; concentración parcelaria, 1; selección de semillas, 1, y contabilidad agrícola, 1.

Esto por lo que se refiere a la rama agrícola. Respecto a la ganadera, se dedicaron al ganado vacuno, 32; a las industrias lácteas, 25; al ganado ovino, 15; al porcino, 9; al ganado equino, 7; a la ganadería en general, 6; a las enfermedades del ga-

CAPSES Y CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA, ARAGON Y RIOJA

(San Andrés 16, y San Jorge, 8, Zaragoza)

VARIEDADES: Ohio M-15 (SP); Indiana 251 A (M); U. S. 13 (T).

INAGRISA (Antonio Maura, 10 — Madrid)

VARIEDADES: United U-26 (P); United U-28 (SP); United U-32 (SP); United U-41 (M); United U-42 (MD); United U-52 (ST); United U-59 (ST); United U-67 (T); United U-72 (MT).

Maíces blancos: United U-3 (P); United U-6 (T); United U-7 (MT).

PRODES (Menéndez Pidal, 4 Valladolid)

VARIEDADES: Wisconsin 355 (P); Ohio M-15 (SP); Wisconsin 641 AA (MD).

SEMILLAS SELECTAS (García Maura, 18 — Madrid)

VARIEDADES: D. Kalb 46 (P); D. Kalb 56 (P); D. Kalb 239 (SP); D. Kalb 627 (MD); Huevo R-75 (MD); D. Kalb 1.002 (T); D. Kalb 1.023 (MT).

OBSERVACIONES

Para la elección de los híbridos más adecuados recomendamos que se tengan en cuenta las características de cada uno expresadas por las letras que van entre paréntesis a continuación de cada variedad, cuyo significado es el siguiente:

P.—Maíces de ciclo corto «prodrados» para los zonas más frías del Norte de España, pudiendo utilizarse también en gran parte del resto de la Península para siembras rastros que se hagan tardíamente.

SP.—Maíces de ciclo semicorto adecuados para siembras de primera cosecha en las zonas de poca altura y abrigadas del Norte y en zonas altas y frescas del resto de España y como rastros para las siembras de muy tardía.

M.—Maíces de ciclo medio; pueden utilizarse en los puntos más cálidos del litoral del Norte con siembras muy tempranas; en siembras normales del Centro y Cuencas del Ebro y algo tardías de Levante. Norte de Andalucía y Extremadura. También tienen aplicación como maíces de segunda cosecha o rastros para los regadíos del Sur.

En caso de duda, consultar con las propias entidades, indicándoles el tipo de cultivo que va a darse al maíz, el lugar de la siembra y la fecha aproximada en que ésta ha de realizarse, o con la Jefatura Agronómica de esta provincia, a cuya amabilidad debemos los precedentes datos.

Maquinaria vinícola y oleícola moderna

Ultimos modelos de gran perfección y máximo rendimiento

Instalaciones completas de bodegas cooperativas y particulares

Prensas oleícolas MABILLE incontestablemente superiores a las demás por su obturador «Hermético» y su hélice «Universal»

Marrodán y Rezola, S. L.

INGENIEROS

Apartado núm 2

LOGROÑO

Todo para el agricultor

INSECTICIDAS AGRICOLAS DE TODAS CLASES

AZUFRES, SULFATO DE COBRE

PRODUCTOS ENOLOGICOS

PARA EL TRATAMIENTO Y CORRECCION DE VINOS DISPONEMOS DE LABORATORIO ENOLOGICO PARTICULAR

Agrícola Enológica de la Rioja

Duquesa de la Victoria, 44

Teléfono 20-37

Logroño

